

## УДК 619

## ЛОЖНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ У СОБАК

*Забелкина Д.А., Безрукова А.В., студентки 4 курса ФВМиБ  
Научный руководитель – Терентьева Н.Ю., доцент, к.в.н.  
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ*

**Ключевые слова:** Собака, ложная беременность, клинические проявления ложной беременности, как поступать в таких случаях, рекомендации.

*Ложная беременность собак – это демонстративное материнское поведение при наличии некоторых физических признаков беременности у небеременной собаки. Этот синдром характерен как для нерожавших собак, так и для собак уже имевших потомство. Наиболее подвержены данному синдрому такие породы собак, как пудели, боксеры, овчарки, той-терьеры и таксы, у последних же ложная щенность считается природной предрасположенностью[1].*

На сегодняшний день синдром ложной щенности [4] встречается довольно часто среди владельцев собак. Часто изменения в поведении сук исчезают сами по себе, но, как показала практика, иногда необходимо вмешательство со стороны ветеринарного специалиста.

Синдром ложной щенности возникает через 1,5 – 2 месяца после течки и продолжается в течение 2 – 3 недель. В этот период времени можно заметить несвойственное физическое и психологическое поведение для животного[2].

У собаки начинает увеличиваться живот, набухают соски, возрастает аппетит, могут присутствовать вспышки агрессии или же наоборот[4], животное ведет себя очень ласково и общительно, собака начинает искать себе место для родов. Собака, после произошедших родов, «усыновляет» игрушки, в особенности мягкие, и защищает их как свое потомство, что выражается в агрессивном поведении при попытке забрать их у нее. После «состоявшихся» родов у собак появляется молоко[1].

При первых симптомах ложной беременности следует увеличить физической нагрузки, убрать все игрушки, которые могут вызвать побочную реакцию. Целесообразным будет для такой собаки назначение диеты с низким содержанием белка. Сцеживать молоко не рекомендуется[5].

Проанализировав статистику в ветеринарной клинике, мы вывели статистику, что за последние 6 месяцев к нам обратились 67 владельцев собак с гинекологическими и акушерскими проблемами. Из них 21 человек обратились с проблемой ложной щенности. Подавляющее большинство, а именно 72% являлись хозяевами собак карликовых и декоративных пород и лишь 28% - крупных и средних пород собак.

Владельцы собак обращались с такими жалобами у своего питомца как,

округление живота, набухшие молочные железы с выделявшимся из них молоком, видимые изменения в поведении, повышенный аппетит. У некоторых из собак данные признаки проявились уже после первой течки.

Схема лечения для каждого животного назначалась лишь после полного осмотра и сбора подробного анамнеза врачом. Владельцам собак рекомендовалось увеличить физическую нагрузку животному, придерживаться диеты, т.е. кормить кормами с низким содержанием белка, количество воды оставить прежним. Из медикаментов животным в обязательном порядке назначался препарат Лакто-Стоп, он способствует снижению уровня пролактина в крови животного, подавляет выработку молока и лактацию, приводит поведение собак в норму и, что самое важное, не оказывает вредного влияния на организм животного. После начала приема данного препарата улучшения наступали уже на 2 – 3 сутки.

Владельцам собак, у которых ложная щенность наблюдается уже не впервые, советуем рассмотреть радикальный метод решения проблемы, а именно стерилизацию собаки, для сохранения ее жизни и здоровья, т.к. в дальнейшем периодически повторяющийся синдром может привести к развитию пиометры, маститам, опухолям молочных желез, матки и яичников[1,3].

#### *Библиографический список:*

1. Жукова И.И., Дегай В.Ф. Ложная беременность и пиометра у собак - 2008.С. 11-12.
2. Круглова А.В., Столбова О.А. Природная предрасположенность к ложной беременности у собак/ Сборник статей всероссийской научной конференции. 2017. С. 262 – 265.
3. Razzaque WAA et al. 2008. False pregnancy in bitch. Veterinary World.
4. Даричева, Н.Н. Основы ветеринарии: учебно-методический комплекс / Н.Н.Даричева, В.А.Ермолаев / Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия. - Ульяновск, 2009. - Том 1. – 201 с.
5. Клинический ветеринарный лексикон/ В.Н. Байматов, В.М.

## **FALSE PREGNANCY IN DOGS**

*Zabelkina D.A., Bezrykova A.V.*

**Key words:** *Dog, false pregnancy, clinical manifestations of false pregnancy, how to act in such cases, recommendations.*

*False pregnancy of dogs is demonstrative maternal behavior in the presence of some physical signs of pregnancy in a non-pregnant dog. This syndrome is characteristic of both dogs that do not give birth and dogs that have already had offspring. Dog breeds such as poodles, boxers, shepherd dogs, toy terriers and dachshunds are the most susceptible to this syndrome, while in the latter, false breeding is considered a natural predisposition.*