

УДК: 619:617.002.3+636.8

АБСЦЕССЫ У КОШЕК

**Рушнова О.М., студентка 4 курса факультета
ветеринарной медицины и биотехнологий.**

**Научный руководитель: Ермолаев В.А., доктор
ветеринарных наук, профессор
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ**

Ключевые слова: абсцесс, воспалительный процесс, кошки, хирургическое вмешательство, антибиотикотерапия, операция.

Статья посвящена такому патологическому процессу, как абсцесс. В данной работе описываются классификация, клиническая картина, методы диагностики и хирургического лечения при абсцессе у кошек.

Абсцесс – воспалительная реакция, при которой вокруг гнойного очага формируется соединительнотканная капсула. Роль этой оболочки заключается в недопущении дальнейшего распространения процесса и проникновения болезнетворной микрофлоры в другие органы и ткани. Поэтому главная угроза состоит именно в нарушении целостности капсулы. [4]

При ее расплавлении гноем формируется флегмона – разлитое подкожное воспаление, охватывающее большие участки тела. Также самопроизвольный прорыв абсцесса внутрь может привести к перитониту, менингиту, проктиту и другим воспалительным процессам, в зависимости от локализации очага инфекции. Кроме того, «холодные» гнойники часто становятся «бомбой замедленного действия», которая в любой момент может образовать свищевые ходы или спровоцировать септицемию. Поэтому, обнаружив у кошки симптомы формирования гнойника, нужно незамедлительно обратиться к ветеринарному врачу для диагностики и выбора стратегии лечения. [3]

Наиболее часто гнойники у животных формируются под влиянием травматических факторов – после драки за территорию, падения с высоты, попадания в подушечки лап заноз и острых осколков. Но

встречаются и иные причины формирования абсцессов, такие как маститы при вскармливании, кариесы, хронические и острые заболевания. Особенно велик риск развития абсцессов у животных с ослабленным иммунитетом – кошек после окота, старых и измученных хроническими заболеваниями. Существует также и вирус иммунодефицита – родной «брат» человеческого СПИДа. Поэтому при частых заболеваниях, абсцессах и кожных высыпаниях целесообразно сделать тест на эту болезнь. [2]

Заметить поверхностные абсцессы несложно. Особенно с учетом того, что кошки ярко реагируют на боль – они не позволяют прикоснуться к зоне воспаления, лежат на одном боку, а при попытке приласкать часто отвечают агрессией. У короткошерстных и лысых кошек увидеть припухлость можно невооруженным взглядом.

Для расположенных под кожей абсцессов характерно формирование припухлости – сначала мягкой, горячей и болезненной, позже – упругой и флюктуирующей при пальпации. Эту особенность стоит считать верным диагностическим признаком. [1]

Многое зависит и от локализации абсцесса. Если он формируется в подушечках лап или между ними, кошка будет хромать, поджимать конечность и препятствовать ее осмотру.

При одонтогенном абсцессе первыми признаками становятся отказ от корма и обильное слюнотечение. С развитием воспалительного процесса становится очевидной припухлость и асимметрия мордочки. Располагаться такой абсцесс может, как под нижней челюстью, так и над верхней – в этом случае нередко «заплывает» глаз, превращаясь в узкую щелочку. [4]

Расположение в области прямой кишки вызывает боли при опорожнении кишечника. Поэтому кошка часто из туалета возвращается галопом и прячется под мебелью, а затем начинает справлять нужду по всей квартире. [3]

Одним из самых опасных считается абсцесс молочной железы. При этом кошка перестает подпускать котят, болезненные железы увеличиваются в объеме в несколько раз, обретают синюшно-красный цвет.

Возможно и истечение небольших капель гноя с кровью из соска. [1]

Сложнее всего распознать абсцессы, расположенные во внутренних органах. О них может свидетельствовать устойчивый подъем температуры выше 41 градуса, потеря аппетита, боли в животе, усиливаются и симптомы хронического заболевания. Например, при абсцессе печени нарушается пищеварение, возникают чередующиеся поносы и запоры, рвота, резкий запах желчи или сероводорода от питомца. Сложить все в одну картину непросто, а подтвердить предположение способны только современные методы диагностики – МРТ, КТ и УЗИ. [2]

В ветеринарии существует несколько классификаций абсцессов. Наибольшее значение из них обрели четыре – по локализации, характеру, течению и стадии развития. [1]

По расположению гнойники делят на внешние и внутренние. Кроме того, отдельно выделяют: гнойный абсцесс у кошек, одонтогенные или зубные, параанальные (под хвостом), абсцессы молочных желез.

Именно они считаются наиболее опасными для жизни животных. Располагаясь в деликатных зонах с обильным кровоснабжением, они склонны к образованию свищей, гнойному расплавлению соединительнотканых стенок, быстрому распространению на близлежащие органы и ткани. Кроме того, для них свойственны такие осложнения, как гангрена и сепсис. Поэтому при наличии малейших подозрений следует отправиться к ветеринарному врачу. [3]

По характеру абсцессы делят на две группы:

Доброкачественные, которые не несут риска для жизни вашего питомца. Они благополучно излечиваются, а при самопроизвольном вскрытии достаточно обрабатывать рану антисептиками и не допустить повторного размножения микрофлоры.

Злокачественные, несущие высокий риск развития осложнений. Прежде всего, к ним относят параанальные, одонтогенные, маститные и абсцессы внутренних органов. [4]

По течению гнойники делят на горячие (с ярко выраженными

симптомами, повышением местной и общей температуры, болезненностью и напряженностью тканей) и холодные (со стертыми признаками развития, выявить которые удастся только при помощи аппаратуры – узи или мрт). [2]

По стадии развития выделяют зрелые и незрелые абсцессы. В первом случае соединительнотканная капсула уже полностью сформирована, а при прощупывании ощущается присутствие внутри припухлости жидкости. Во втором ограничительных барьеров еще нет, ярко выражены болезненность и повышение местной температуры, кошка не позволяет прикоснуться к очагу воспаления. [5]

Хирургическое лечение - единственно верный выбор для «созревших» абсцессов. Их вскрывают, полость освобождают от гноя и промывают. Швы накладываются только при обширных разрезах, при этом в полости располагают дренаж для стока экссудата. Владелец остается только правильно ухаживать за раной и ждать ее заживления. Для обработки назначают антисептики – перекись водорода, хлоргексидин, стрептоцид. [1]

Сочетание хирургического и медикаментозного лечения выбирают при внутренних и злокачественных абсцессах. Гнойные полости вскрывают и очищают от гноя, ткани сшивают, а животному назначают: курс антибиотиков на 5-7 дней, противовоспалительные препараты, средства для обработки швов.

При злокачественных и внутренних абсцессах важно постоянно контролировать температуру тела питомца. Нормой для кошек считается 38-39 градусов, в первые дни после операции допустимо субфебрильное повышение – до 40 градусов. Высокая температура в более поздние сроки и свыше 41 градуса может говорить о генерализации инфекции – нужно незамедлительно обратиться к ветврачу. [4]

Библиографический список:

1. Моисеенко Л.С. Заболевания мелких домашних животных. Лечение и профилактика / Л.С. Моисеенко – М.: Феникс, 2016. – С. 111-113.

2. Павлова Д.А. Лечение боли у мелких домашних животных / Д.А. Павлова, В.А. Калинова – М.: Аквариум-Принт, 2023 г – С. 45-48.

3. Абсцессы у котов: причины, лечение, последствия [Электронный ресурс]: Официальный сайт. Режим доступа: <https://www.dogeat.ru/blog/abstsess-u-kotov-prichinyi-lechenie-posledstviya/>

4. Абсцессы у кошек [Электронный ресурс]: Официальный сайт. Режим доступа: <https://yaroshenko.vet/articles/abscesses-in-cats/>

5. Абсцессы у кошек: причины, симптомы, лечение [Электронный ресурс]: Официальный сайт. Режим доступа: <https://vetcenterst.ru/stati/abscess-u-koshki-kota-lechenie-chto-delat/>

ABSCESSES IN CATS

Rushnova O.M.

Key words: *abscess, inflammatory process, cats, surgery, antibiotic therapy, operation.*

The article is devoted to such a pathological process as an abscess. This paper describes the classification, clinical picture, diagnostic methods and surgical treatment for abscess in cats.