УДК 636.934.3

ВОСПРИИМЧИВОСТЬ СЕРОЙ КУРОПАТКИ К РАЗЛИЧНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Буянова Д.С., студентка 2 курса колледжа агротехнологий и
бизнеса

Научный руководитель – Проворова Н.А., кандидат ветеринарных
наук, доцент

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ

Ключевые слова: серая куропатка, питание, кладка яиц, ареал обитания, дичеразведение.

В статье рассматривается экология серой куропатки, её морфологические и физиологические особенности, восприимчивость к заболеваниям. Кратко описываются главные аспекты дичеразведения данного вида птиц.

Введение. Серая куропатка (*Perdix perdix*L.) – является широко распространённым видом из рода куропаток, семейства фазановых. В быту её часто называют «дикой курицей» за внешнее сходство с этим домашним пернатым [1,2].

Птица имеет компактное тело округлой формы, общая длина которого 28-32см, размах крыльев 45-48 см, масса 310-600г. Клюв и ноги характерного тёмного цвета. Осенью и зимой окраска менее яркая. Тем не менее, при общей покровительственной однотонной серой окраске оперения, хвост у птиц рыжий, что особенно хорошо заметно в полёте. В интенсивности окраски проявляется и половой диморфизм у вида: самки окрашены бледнее, чем самцы, что обусловлено вынужденной маскировкой [3].

Эти птицы летают на небольшие расстояния, предпочитая, при необходимости, спастись бегством. В конце сентября – начале октября серые куропатки собираются в стаи, достигающие 30-50 птиц, и в середине октября у них начинаются активные местные подвижки к местам зимовок.

Питаются куропатки преимущественно растительной пищей, но в корме птенцов также преобладают насекомые. Специфика питания, а именно – адаптация к потреблению грубого вегетативного корма в зимний период, привела к усилению клюва, хорошему развитию его режущих кромок, предназначенных для раскусывания мелких веток и хвоинок. Зоб у птиц достаточно объемист и служит главным образом «складом» пищи. Особое строение пищеварительной системы позволяет куропаткам сократить затраты времени и энергии на кормежку [4,5].

Известно, что серая куропатка имеет наибольшую величину кладки среди птиц Европы и Северной Азии. В сводке, посвящённой птицам СССР, указывается, что число яиц в кладке изменяется от 4 до 28, но в большинстве случаев размах варьирования укладывается в пределы 12-18 яиц. Многими исследователями отмечается, что самка серой куропатки сидит на гнезде очень плотно и покидает его только в случае крайней опасности. Такое поведение является основной причиной относительно небольшого числа гнёзд серой куропатки, осмотренных отечественными орнитологами, несмотря на её широкое распространение и местами довольно высокую численность.

Ареал обитания серой куропатки достаточно велик. Птица обитает в умеренной зоне Евразии. Населяет практически всю территорию Европы, Малую Азию, Казахстан и юг Западной Сибири, от Британских островов и Скандинавии до Алтая и Тувы, а также странах Северной Америки. На северной границе своего ареала, она встречается очень редко в течение круглого года, в небольшом числе зоологи отмечают закономерное флуктуирующее снижение её численности.

Разведение серой куропатки в условиях специализированных ферм широко развито в Западной Европе. В нашей стране также ведутся работы по введению серой куропатки в культуру.

Дичеразведение – это содержание в питомниках охотничьих хозяйств или на специальных дичеразводных базах племенного поголовья различных охотничьих птиц, инкубирование их яиц, выращивание полученных птенцов до определенного возраста, по достижении которого молодые птицы выпускаются в охотничьи угодья [6].

Среди объектов искусственного дичеразведения важное место занимает серая куропатка, которую ежегодно выпускают в естественную среду обитания в количестве более 4 млн. голов. Данный вид пернатых хорошо уживается в сельскохозяйственном ландшафте и легко размножается в искусственных условиях.

При клеточном содержании часть птиц показывала достаточно высокие результаты яйценоскости. Это говорит о способности отдельных особей хорошо справляться со стресс-факторами, возникающими при подобного рода содержании, и реализовывать свой продуктивный потенциал. Что важно, при кормлении в условиях разведения необходимо учитывать особенности питания птиц.

Заключение. Вследствие того, что серая куропатка является объектом охоты, численность данного вида птиц за последние 30-40 лет сократилась в большинстве районов страны. Поэтому, считается вполне целесообразным осуществление дичеразведения серых куропаток как ресурсных видов птиц.

Библиографический список:

1. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: справочное пособие / Под ред. А.П. Калашникова, В.И. Фисинина, В. В. Щеглова, Н. И. Клейменова. – М.: ВНИИЖ, 2003. – 456 с.
2. Проворова, Н.А. Учебное пособие по ПМ 01 Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий для студентов, обучающихся в колледже агротехнологий и бизнеса Ульяновского ГАУ специальности 36.02.01. /Н.А. Проворова, Л.П. Пульчеровская. - «Ветеринария». – Ульяновск: УГАУ им. П.А. Столыпина, 2023.- 363с.
<https://moodle.ulsau.ru/course/view.php?id=17914>
3. Зерновые корма – общая характеристика [Электронный ресурс] Режим доступа: https://direct.farm/user/favorites/prefer?view=post__5606 [Дата обращения: 11.02.24г.]
4. Проворова, Н.А. Патологическая анатомия животных с основами гистологии: учебное пособие к лабораторно-практическим занятиям по патологической анатомии животных для студентов,

обучающихся на факультете ветеринарной медицины и биотехнологии по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, очной, очно-заочной и заочной форм обучения /Н.А. Проворова. - Ульяновск: УлГАУ, 2019. – 159с. <http://lib.ugsha.ru/>

5. Проворова, Н.А. Патологическая анатомия (секционный курс): учебное пособие для студентов факультета ветеринарной медицины и биотехнологии / Н.А. Проворова. – Ульяновск: УлГАУ, 2019. – 75с. <https://moodle.ulsau.ru/course/view.php?id=20668>

6. Проворова, Н.А. Патологическая анатомия животных с основами гистологии: учебное пособие к лабораторно-практическим занятиям по патологической анатомии животных для студентов, обучающихся на факультете ветеринарной медицины и биотехнологии по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, очной, очно-заочной и заочной форм обучения /Н.А. Проворова. - Ульяновск: УлГАУ, 2019. – 159с. <http://lib.ugsha.ru/>

SUSCEPTIBILITY OF THE GRAY PARTRIDGE TO VARIOUS DISEASES

Buyanova D.S.

Scientific supervisor – Provorova N.A.

FSBEI HE Ulyanovsk SAU

***Keywords:** gray partridge, nutrition, egg laying, habitat, game breeding.*

The article discusses the ecology of the gray partridge, its morphological and physiological characteristics, and susceptibility to diseases. The main aspects of game breeding of this bird species are briefly described.